



什麼是新生兒戒斷症候群？

新生兒戒斷症候群 (NAS) 發生於出生前暴露可能成癮藥物的嬰兒，這些藥物可能為：

- 處方藥物（例如 oxycodone [用於慢性疼痛]或 methadone）
- 非法（街頭）藥物（例如古柯鹼 [cocaine]／快克 [crack]、海洛因 [heroin]、結晶甲基安非他命 [crystal meth]）

嬰兒還在子宮時對藥物成癮，出生之後，嬰兒會經歷戒斷症狀過程，這些症狀構成 NAS。


NAS 有什麼症狀？

症狀取決於許多因子，包括但不限於：

- 使用的藥物種類
- 多常（和持續多久）使用藥物
- 使用多少藥物
- 嬰兒是否提早出生（早產）

大多數 NAS 症狀在出生後幾天內發生，其中包括：

- 哭鬧不安和／或過分激動
- 高音頻的哭聲
- 餵哺不足
- 發燒和／或出汗
- 呼吸速率變快
- 皮膚上有顏色斑點（斑駁）
- 腹瀉和／或嘔吐
- 反射動作增加
- 很難睡著
- 鼻塞、打噴嚏
- 痙攣或震顫



新生兒戒斷症候群由藥物戒斷所導致，症狀可能影響許多身體部位，包括神經系統、消化系統、肺臟和肌肉。

