



什麼是自發性腸穿孔？

自發性腸穿孔又稱為 SIP，是消化系統中稱為腸子的部分產生小破洞。這種破洞是自發性的，或者孤立的，因為罹患 SIP 的嬰兒通常沒有其他消化系統的問題。

SIP 可能會讓某些腸子內容物漏出進入腹部（肚子），會導致刺激或感染。

SIP 有什麼症狀？


罹患 SIP 的嬰兒通常會肚子脹大（腹脹）、血壓過低（低血壓）和呼吸困難。在某些案例中，腹部可能看起來有點灰色或藍色。

SIP 有多常見？

每 100 名出生體重極低（低於 3.5 磅）的早產嬰兒中，不到 5 名發生 SIP。在妊娠期滿嬰兒或出生體重正常的嬰兒中不常見到 SIP。

SIP 如何診斷？

在具有 SIP 症狀的嬰兒中，X 光會用於查看腸子內容物漏出進入腹部的徵象。



瞭解自發性腸穿孔 (續)

SIP 如何治療？

SIP 以兩階段進行治療。首先，醫護團隊會努力改善嬰兒感受，他們可能會：

- 停止讓食物或藥物進入嬰兒消化系統中（口服或經由管子）
- 餵哺嬰兒並靜脈內給予藥物（透過 IV）
- 使用抽吸來釋放腹部氣體
- 使用抗生素來治療感染

其次，醫護團隊會自己治療 SIP。治療有 2 大類型：

- **腹膜引流**，將液體從腹部透過**引流管**排除。引流管會留置數天，目標是要讓破洞有時間自行痊癒。
- 手術修補破洞。

這種治療選擇取決於許多因素，請詢問您的醫護團隊，以瞭解最適合您嬰兒的治療方式。

我將如何得知我的嬰兒情況如何？

新生兒加護病房 (NICU) 團隊將讓您得知您嬰兒健康的即時進展。腸子經常需要數週時間來痊癒，之後嬰兒才能開始口服進食。

接下來會發生的事？

許多嬰兒對於 SIP 治療反應良好；但是每個嬰兒都是不同的。請與您嬰兒的醫護團隊討論，他們可以解答任何您有關您的嬰兒的疑問。

詞彙表

腹部 – 肚子

腹脹 – 肚子脹大

消化系統 – 處理食物的一組器官，其中包括口腔、胃部、肝臟、胰臟和腸道

引流管 – 用於排除液體的小塑膠管

腸 – 消化系統的部分

靜脈內 – 透過靜脈

低血壓 – 血壓過低

穿孔 – 小孔洞或裂開

腹膜的 – 與腹部內襯組織薄層有關的

自發性 – 沒有已知原因

如果您有疑問，請詢問醫護團隊，他們很樂意協助您。請造訪 www.nicu-pet.com，下載額外副本。

附註：
